

INSTRUCTIONS FOR USE OF BIOCIDES

SOLFAC® TRIO EC140 NF

Person making available on the market, Manufacturer:

Indupharma Srl,
 Via Sorgaglia,
 40, Arre, 35020
 Italy

Main group 3 - Pest control.

Product type 18 – Insecticides, acaricides and other arthropod control products .

Active ingredient :

Cypermethrin (cis/trans 40/60) (CE: 257-842-9, CAS 52315-07-8) – 5% (50 g/L),

Prallethrin (CE: 245-387-9, CAS 23031-36-9) - 1% (10 g/L)

Piperonyl butoxide (EC: 200-076-7, CAS 51-03-6) – 8% (80 g/L)



ATTENTION

H410 Very toxic to aquatic life with long-term effects.

P102 Keep out of reach of children.

P273 Avoid release to the environment.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

P391 Collect spillage.

P501 Dispose of contents/container in accordance with national legislation.

Type of formulation – EC (Emulsion Concentrate)

Physical and chemical properties: Solfac® Trio EC 140 NF is a concentrated liquid insecticide with a broad spectrum of action intended to combat flying and crawling insects in the public hygiene sector (disinfestation).

Area of use: Solfac® Trio EC 140 NF is used to combat arthropods (mosquitoes, flies, cockroaches) in domestic, commercial and industrial areas, indoors and outdoors. Indoors, for residual insecticidal treatments (several weeks) in houses, apartment buildings, hotels, restaurants, hospitals, food factories, schools and kindergartens, animal farms, garages, bridges and warehouses, and outdoors, in public areas (parks, alignments, green areas, directly on vegetation) and outside buildings.

Solfac® Trio EC 140 NF can be applied residually, by spraying, with a backpack pump, after dilution with water, or with high-power mechanical equipment (atomizers, cold foggers, thermofoggers or LV/ULV fine mist generators), after dilution with water or another organic solvent.

Target organisms: Crawling insects (cockroaches – *Blattella germanica*, *Blatta Orientalis*, flying insects (flies – *Musca Domestica*, mosquitoes – *Culex Pipiens*, *Aedes Albopictus*).

Method of use:

Application rate

Application method	Concentration / dose rate
Cold fogging (LV) and ULV	Working solution concentration: 0.4% - 1.2 L product in 300 L solvent (vegetable oil, water) - for normal infestations; 0.8% -1.2 L product in 150 L solvent (vegetable oil, water) - for severe infestations; Application dose working solution: 0.5-5L mixture/10,000 m2 (working solution, equivalent to 3-6 g total s.a.)

Thermal fogging	Working solution concentration: 1 L product in 69 L diesel or kerosene Application dose: 1 L mixture (working solution) per 10,000 m ²
Spraying with low-pressure pumps or turbo-atomizers, indoors and outdoors	Mosquitoes and other flying insects Working solution concentration: 0.2-0.3% (20-30 ml product in 10 L water); Application dose: 10 L mixture (working solution) per 500 - 1000 m ² Flies, cockroaches and other crawling insects Working solution concentration: 1-2% (100-200 ml product in 10 L water); Application dose: 1 L mixture (working solution) per 500-1000 m ²
Conventional spraying	Mosquitoes and other flying insects Working solution concentration: 0.2-0.3% (20-30 ml product in 10 L water); Application dose: 1 L mixture (working solution) per 15 m ² Flies, cockroaches and other crawling insects Working solution concentration: 1-2% (100-200 ml product in 10 L water); Application dose: 1 L mixture (working solution) per 15 m ²

Biocidal efficacy and action time. Using the following dilutions and a working dose of 1 L of solution per 15 sq m, with an action time of 2-10 minutes, a mortality of 100% was obtained in the case of flying insects: flies - *Musca Domestica* (1.5%), mosquitoes - *Culex Pipiens* (0.5%), *Aedes Albopictus* (0.4%), and for cockroaches - *Blatella germanica* (1.5%), *Blatta Orientalis* (2%) - 100% mortality after 24 hours.

Use-specific instructions:

For control of crawling insects in areas without wet cleaning:

- Spray by spot application into cracks and hard-to-reach areas where insects can hide. Pay special attention to doors, windows, cracks and hard-to-reach areas, and other entry points commonly used by insects, as well as areas behind or under machinery, kitchen equipment or pipes.
- In case of infestation, spray into cracks and hard-to-reach areas in adjacent surfaces of walls and floors. Spray infested carpets and pay special attention to the edges of carpets.

Risk mitigation measures:

- Keep out of reach of children.
- The product should be applied in such a way that pets, livestock, food (animal products) and feed do not come into contact with the product.
- Do not apply directly to surfaces on which food or feed is stored, prepared or consumed.
- Protect/remove food before treatment. Before treatment, cover water storage tanks, food preparation surfaces, food preparation equipment and cutlery with impermeable plastic sheeting. After treatment, remove the sheeting and clean the surfaces.
- In accordance with best practice for professional disinfection operators, it is recommended to wear gloves and coveralls when mixing/loading and during application of the product.
- Do not use in direct contact with or in the presence of animals (especially birds) of food and food.
- For professional users, repackaging the product to smaller capacities for marketing purposes is prohibited. After opening a container, the effectiveness of the product decreases significantly. Any transfer from a large container to a small one influences the quality of the product, and there is also a risk of potential contamination.

Application: When applying the product, wear appropriate equipment, face mask, suitable gloves (rubber, PVA or nitrile), safety glasses and overalls.



Discard equipment that is internally contaminated, that is punctured or for which external contamination cannot be removed. Avoid excessive contamination of overalls and wash them regularly. Avoid contact with skin and mucous membranes.

Never store diluted insecticide. Prepare a fresh solution whenever necessary. Wash hands and exposed skin before meals and after work. Immediately wash any contamination from skin or eyes. Indoors, do not apply with other people in the room, except the person(s) actually carrying out the application. Indoor application must take into account the irritating nature of the product, which is why the non-accessibility of the treated space for 24-72 hours and the obligation of natural ventilation, before returning the space to use for 2-8 hours, are absolutely mandatory and essential conditions in obtaining superior treatment results. If necessary, a possible reapplication can be made after 3-7 days from the first application.

First aid measures:

Skin contact: a slight burning or stinging sensation may occur. Remove contaminated clothing and footwear. Wash skin immediately with plenty of soap and water. Seek medical advice if irritation persists for more than 24-48 hours.

Eye contact: rinse immediately with plenty of cold water for at least 15 minutes. Consult a doctor.

In case of ingestion: rinse mouth with plenty of water and do not induce vomiting under any circumstances. Do not consume any food or drink. Ensure ventilation and consult a doctor.

Antidote: There is no antidote. Symptomatic treatment is recommended. The administration of activated charcoal, without being a specific solution, has been reported to bring positive results and improve the general condition. In the event of convulsions, benzodiazepines (e.g. Diazepam) should be administered, preferably under medical supervision, or, if they are not effective, phenobarbital may be used.

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). Medically supervised treatment (in case of severe poisoning): consult the product safety data sheet.

Treatment – symptomatic.

Storage: Store in the original packaging. Store in a cool, dry and well-ventilated place. Keep away from freezing. Store away from light.

Transport: To be transported in covered vehicles, separate from food, drink and chemicals. To comply with the requirements for individual types of transport.

Batch number: see packaging.

Production date: see packaging.

Shelf life: 2 years from the date of manufacture.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY!

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE !

მწარმოებელი კომპანია:

შპს „Indupharma“

სორგალის ქუჩა,

40, არე, 35020

იტალია

მთავარი ჯგუფი 3 - მავნებლების კონტროლი.

პროდუქტის ტიპი 18 – ინსექტიციდები, აკარიციდები და ფეხსახსრიანების კონტროლის სხვა პროდუქტები.

აქტიური ინგრედიენტი:

ციპერმეტრინი (ვის/ტრანს 40/60) (CE: 257-842-9, ქიმიური აბსტრაქტების სამსახური: 52315-07-8) – 5% (50 გ/ლ),

პრალეთრინი (CE: 245-387-9, ქიმიური აბსტრაქტების სამსახური: 23031-36-9) - 1% (10 გ/ლ)

პიპერონილბუტოქსიდი (EC: 200-076-7, ქიმიური აბსტრაქტების სამსახური: 51-03-6) – 8% (80 გ/ლ)

	H410 ძალიან ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისთვის და აქვს აქვს ხანგრძლივი ეფექტები. P102 შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. P273 თავიდან აიცილეთ გარემოში გამოთავისუფლება. P280 ატარეთ დამცავი ხელთათმანები/დამცავი ტანსაცმელი/თვალების/სახის დამცავი საშუალებები. P301+P310 გადაყლაპვის შემთხვევაში: დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ტოქსიკოლოგიურ ცენტრს/ექიმს. P391 შეაგროვეთ დაღვრილი ნივთიერება. P501 განახორციელეთ შიგთავსის/კონტეინერის განკარგვა ეროვნული რეგულაციების შესაბამისად.
ყურადღება	

ფორმულაციის ტიპი – EC (ემულსიური კონცენტრატი)

ფიზიკური და ქიმიური თვისებები: Solfac® Trio EC 140 NF არის მოქმედების ფართო სპექტრის მქონე კონცენტრირებული თხევადი ინსექტიციდი, რომელიც განკუთვნილია მფრინავი და მცოცავი მწერების წინააღმდეგ საბრძოლველად საზოგადოებრივი ჰიგიენის სექტორში (დეზინფექცია).

გამოყენების არეალი: Solfac® Trio EC 140 NF გამოიყენება ფეხსახსრიანების (კოლოები, ბუზები, ტარაკნები) წინააღმდეგ საბრძოლველად საბრძოლველად საყოფაცხოვრებო, კომერციულ და სამრეწველო ზონებში, შიდა და გარე სივრცეში. შიდა სივრცეში, ნარჩენი ინსექტიციდების დასაშუშავებლად (რამდენიმე კვირის განმავლობაში) სახლებში, მრავალბინიან კორპუსებში, სასტუმროებში, რესტორნებში, საავადმყოფოებში, საკვების ქარხნებში, სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში, ცხოველთა ფერმებში, ავტოფარეხებში, ხიდებსა და საწყობებში და გარე სივრცეში, საზოგადოებრივ ადგილებში (პარკებში, გზატკეცილებში, გამწვანებულ ზონებში, პირდაპირ მცენარეულობაზე) და შენობებს გარეთ.

Solfac® Trio EC 140 NF შეიძლება დატანილ იქნეს ნარჩენი სახით, წყალში განზავების შემდეგ ზურგის ტუმბოს გამოყენებით, ან ძლიერი მექანიკური აღჭურვილობის გამოყენებით (საფრქვევლები, ცივი მემბრანები, თერმომემბრანები ან LV/ULV წვრილი ბურუსის გენერატორები), წყლით ან სხვა ორგანული გამხსნელით განზავების შემდეგ.

სამიზნე ორგანიზმები: მცოცავი მწერები (ტარაკნები – გერმანული ტარაკანი, აღმოსავლური ტარაკანი), მფრინავი მწერები (ბუზები - ოთახის ბუზი, კოლოები – ჩვეულებრივი სახლის კოლო, აზიური ვეფხვი კოლო).

გამოყენების

მეთოდი:

დატანის ნორმა

დატანის მეთოდი	კონცენტრაცია/დოზის მაჩვენებელი
ცივი ბურუსწარმოქმნა (LV) და ULV	სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია: 0.4% - 1.2 ლ პროდუქტი 300 ლ გამხსნელში (მცენარეული ზეთი, წყალი) - ნორმალური ინვაზიებისთვის; 0.8% - 1.2 ლ პროდუქტი 150 ლ გამხსნელში (მცენარეული ზეთი, წყალი) - მძიმე ინვაზიებისთვის; სამუშაო ხსნარის დატანის დოზა: 0,5-5 ლ ნარევი/10000 მ² (სამუშაო ხსნარი, ექვივალენტური 3-6 გ ჯამური s.a.-სი)



თერმოზურესწარმოქმნა	სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია: 1 ლ პროდუქტი 69 ლ დიზელში ან ნავთში დატანის დოზა: 1 ლ ნარევი (სამუშაო ხსნარი) 10,000 მ²-ზე
შესხურება დაბალი წნევის ტუმბოებით ან ტურბოსაფრქველებით, შიდა და გარე სივრცეებში	კოლოები და სხვა მფრინავი მწერები სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია: 0,2-0,3% (20-30მლ პროდუქტი 10 ლ წყალში); დატანის დოზა: 1 ლ ნარევი (სამუშაო ხსნარი) 500 - 1000 მ²-ზე ბუზები, ტარაკნები და სხვა მცოცავი მწერები სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია: 1-2% (100-200 მლ პროდუქტი 10 ლ წყალში); დატანის დოზა: 1 ლ ნარევი (სამუშაო ხსნარი) 500-1000 მ²-ზე
ჩვეულებრივი შესხურება	კოლოები და სხვა მფრინავი მწერები სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია: 0,2-0,3% (20-30 მლ პროდუქტი 10 ლ წყალში); დატანის დოზა: 1 ლ ნარევი (სამუშაო ხსნარი) 15 მ²-ზე ბუზები, ტარაკნები და სხვა მცოცავი მწერები სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია: 1-2% (100-200 მლ პროდუქტი 10 ლ წყალში); დატანის დოზა: 1 ლ ნარევი (სამუშაო ხსნარი) per 15 მ²-ზე

ბიოციდური ეფექტურობა და მოქმედების დრო. შემდეგი განზავებების და 15 კვ.მ-ზე 1 ლ ხსნარის სამუშაო დოზის გამოყენებით, 2-10 წუთიანი მოქმედების დროით, მიღწეულ იქნა 100%-იანი სიკვდილიანობა მფრინავი მწერების შემთხვევაში: ბუზები - ოთახის ბუზი (1.5%), კოლოები - ჩვეულებრივი ოთახის კოლო (0.4% - Alimropicaches) და გერმანული ტარაკანი (1.5%), ამოსავლური ტარაკანი (2%) - 100%-იანი სიკვდილიანობა 24 საათის შემდეგ.

გამოყენების სპეციფიკური ინსტრუქციები:

მცოცავი მწერების კონტროლისთვის არეალებში, სადაც სველი წმენდა არ ტარდება:

- შეასხურეთ წვეთობრივი დატანით ზზარებში და მწელად მისადგომ არეალებში, სადაც მწერები შეიძლება დაიმალონ. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ კარებს, ფანჯრებს, ზზარებს, მწელად მისადგომ ადგილებს და სხვა შესვლის პუნქტებს, რომლებსაც ჩვეულებრივ იყენებენ მწერები, აგრეთვე აპარატურის, სამზარეულოს აღჭურვილობისა თუ მიწების უკან ან ქვეშ არსებულ არეალებს.
- ინფიცირების შემთხვევაში შეასხურეთ ზზარებში და მწელად მისადგომ ადგილებში კედლებისა და იატაკების მიმდებარე ზედაპირებზე. შეასხურეთ ინფიცირებულ ხალიჩებს და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ხალიჩების კიდეებს

რისკის შემსუბუქების ზომები:

- შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- პროდუქტი უნდა იქნას დატანილი იმგვარად, რომ შინაური ცხოველები, პირუტყვი, საკვები (ცხოველის პროდუქტები) და კორმი არ შევიდეს პროდუქტთან კონტაქტში.
- არ დაიტანოთ პირდაპირ ზედაპირებზე, რომლებზეც ინახება, მზადდება ან მოიხმარება საკვები ან კორმი.
- დამუშავებამდე დაიცავით/გაიტანეთ საკვები. დამუშავებამდე წყლის შესანახი ავზები, საკვების მოსამზადებელი ზედაპირები, საკვების მოსამზადებელი მოწყობილობა და დანა-ჩანგალი დაფარეთ გაუმტარი პლასტმასის ფირით. დამუშავების შემდეგ მოხსენით ფირი და გაასუფთავეთ ზედაპირები.
- პროფესიონალი სადეზინფექციო ოპერატორების საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, რეკომენდებულია ხელთათმანების და სპეცტანსაცმლის ტარება პროდუქტის შერევის/დატვირთვისას და დატანისას.
- არ გამოიყენოთ ცხოველებთან (განსაკუთრებით ფრინველებთან) ან საკვებ პროდუქტებთან უშუალო კონტაქტში ან თანდასწრებით.
- პროფესიონალი მომხმარებლებისთვის აკრძალულია პროდუქტის ხელახალი შეფუთვა უფრო მცირე კონტეინერებში მარკეტინგული მიზნებისთვის. შეფუთვის გახსნის შემდეგ, პროდუქტის ეფექტურობა მნიშვნელოვნად მცირდება. წებისმიერი გადატანა დიდი კონტეინერიდან პატარაში გაფლენას ახდენს პროდუქტის ზარისხზე და ასევე არსებობს პოტენციური დაბინძურების რისკი.

დატანა: პროდუქტის დატანისას, ატარეთ შესაბამისი აღჭურვილობა, სახის ნიღაბი, შესაფერისი ხელთათმანები (რეზინის, PVA ან ნიტრილის), დამცავი სათვალეები და სპეცტანსაცმელი.



გადაადგენთ მოწყობილობა, რომელიც არის შიგნიდან დაბინძურებული, დაჩვევითი ან რომლის გარე დაბინძურების მოცილება შეუძლებელია. მოერიდეთ სპეცტანსაცმლის გადაჭარბებულ დაბინძურებას და რეგულარულად გარეცხეთ. მოერიდეთ კონტაქტს კანთან და ლორწოვან გარსებთან.

არასოდეს შეინახოთ განზავებული ინსექტიციდი. აუცილებლობის შემთხვევაში მოამზადეთ ახალი ხსნარი. დაიბანეთ ხელები და კანის დაუცველი ნაწილი ჭამის წინ და მუშაობის შემდეგ. დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ ნებისმიერი დაბინძურება კანიდან ან თვალებიდან. შიდა სივრცეში, ნუ დაიტანთ, როცა ოთახში იქნებიან სხვა ადამიანები, გარდა დატანის განმახორციელებელი პირ(ებ)ისა. შიდა სივრცეში დატანისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული პროდუქტის გამაღიზიანებელი ბუნება, რის გამოც დამუშავებული სივრცის მოუწვდომლობა 24-72 საათის განმავლობაში და ბუნებრივი ვენტილაციის ვალდებულება სივრცის დაბრუნებამდე 2-8 საათის განმავლობაში აბსოლუტურად სავალდებულო და აუცილებელი პირობაა დამუშავების უმაღლესი შედეგების მისაღებად. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია განმეორებითი დატანის განხორციელება პირველი დატანიდან 3-7 დღის შემდეგ.

პირველადი დახმარების ზომები:

კანთან შეხება: შესაძლოა გამოვლინდეს წვის ან ჩხვლეტის შეგრძნება. გახადეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. დაბანეთ კანი დაუყოვნებლივ დიდი რაოდენობით საპნით და წყლით. მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას, თუ გაღიზიანება გაგრძელდება 24-48 საათზე მეტ ხნის განმავლობაში.

თვალთან შეხება: დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ დიდი რაოდენობით ცივი წყლით მინიმუმ 15 წუთის განმავლობაში. მიმართეთ ექიმს. **გადაყლაპვის შემთხვევაში:** ჩამოიბანეთ პირი დიდი რაოდენობით წყლით და არავითარ შემთხვევაში არ გამოიწვიოთ ლებინება. არ მიირთვათ რაიმე საკვები ან სასმელი. უზრუნველყავით ვენტილაცია და მიმართეთ ექიმს.

ანტიდოტი: ანტიდოტი არ არსებობს. რეკომენდებულია სიმპტომური მკურნალობა. გააქტიურებული ნახშირის მიღება, კონკრეტულ გამოსავლად ყოფნის გარეშე, როგორც იუწყებიან, მოიტანს დადებით შედეგებს და გააუმჯობესებს ზოგად მდგომარეობას. კრუნჩხვების შემთხვევაში, ბენზოდიазეპინები (მაგ. დიაზეპამი) უნდა დაინიშნოს, სასურველია ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, ან, თუ ისინი არ იქნება ეფექტური, შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ფენობარბიტალი.

უბედური შემთხვევის შემთხვევაში ან თუ თავს ცუდად გრძნობთ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას (აჩვენეთ ეტიკეტი, შესაძლებლობიდან გამომდინარე). ექიმის ზედამხედველობის ქვეშ მკურნალობა (მძიმე მოწყვლის შემთხვევაში): იხილეთ პროდუქტის უსაფრთხოების პასპორტი.

მკურნალობა - სიმპტომური.

შენახვა: შეინახეთ ორიგინალ შეფუთვაში. შეინახეთ გრილ, მშრალ და კარგად ვენტილირებად ადგილას. დაიცავით გაყინვისგან. შეინახეთ სინათლისგან დაცულ ადგილას.

ტრანსპორტირება: ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში, საკვების, სასმელისა და ქიმიკატებისგან განცალკევებით. დაცული უნდა იქნეს ინდივიდუალური ტიპის ტრანსპორტის მიმართ არსებული მოთხოვნები.

პარტიის ნომერი: იხილეთ შეფუთვა.

წარმოების თარიღი: იხილეთ შეფუთვა.

ვარგისიანობის ვადა: წარმოების თარიღიდან 2 წელი.

მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციები!



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის ნომერი

N250651164



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის თარიღი

30.05.2025 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული მთარგმნელის
ხელმოწერის დამოწმება

ნოტარიუსი

მაკა შარაბიძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

ქალაქი თბილისი, ნავთლუდის ქ. N 9

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591 80 72 75

სანოტარო მოქმედების
ინდივიდუალური ნომერი

69390070856725



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

მე, ნოტარიუსი საქართველოში, მაკა შარაბიძე, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს ქ. თბილისი, ნავთლუდის ქ. N 9, ვადასტურებ ინგლისური ენის დიპლომირებული/სერტიფიცირებული თარგმანის ზაური რამაზანოვის ხელმოწერის ნამდვილობას (დაბადებული 26.06.1985 წელს, დაბადების ადგილი - აზერბაიჯანი, პირადი N 01573000003, რეგისტრირებული: თბილისი, შალვა ნუცუბიძის ფერდობი, IV მიკრო/რაიონი, კორპუსი 17, ბინა 15, სერტიფიკატი №091, გაცემული: სასწავლო ცენტრი „ენების ლაბორატორიის“ მიერ 27.03.2023წ) წარმოდგენილ დოკუმენტზე, ერთ ეგზემპლარად (თითოეული სამ გვერდად). ხელმოწერის პირადობა დადგენილია, ქმედუნარიანობა და ნების გამოვლენის ნამდვილობა შემოწმებულია. თარგმანმა დაადასტურა, რომ იგი ჯეროვნად ფლობს, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენებს, იძლევა სწორი თარგმნის გარანტიას და მისთვის ცნობილია ამ პასუხისმგებლობის შესახებ, რაც ეკისრება თარგმანს არასწორი თარგმნისთვის და არ არსებობს მისთვის თარგმნის გამომრიცხავი რამე გარემოება.

გადახდილია საზღაური თანახმად სანოტარო მოქმედებების შესრულებათა შესრულებისათვის, საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება #507 -ის 31 მუხლისა 12 (თორმეტი) ლარი, ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური 5 (ხუთი) ლარი, თანახმად 39-ე მუხლისა და დღგ 2.16 ლარი თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლისა. სულ გადახდილია 19 (ცხრამეტი) ლარი და 16 (თექვსმეტი) თეთრი.

ნოტარიუსი



მაკა შარაბიძე



საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
სამართლებრივი და საბიზნესო
სამსახური
სამართლებრივი და საბიზნესო
სამსახური

