



Steril +

Zoma Streil + / ზომა სტერილ + ხელის და კანის სადეზინფექციო საშუალება

1. პროდუქტის დახასიათება

1.1. ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები

პარამეტრი	მნიშვნელობა
გარეგნული სახე	გამჭვირვალე უფერო სითხე
სუნი	დამახასიათებელი სპირტის სუნით
სიმკვრივე (20°C)	0,840±0.05 გ/სმ ³
pH	5,5±1,5

1.2. შემადგენლობა

აქტიური ინგრედიენტები:

- ეთილის სპირტი (65%) - ძირითადი ანტიმიკრობული აგენტი
- N პროპანოლი (10%) -ძირითადი ანტიმიკრობული აგენტი
- ბენზალკონიუმის ქლორიდი (0.16%) - ძირითადი ანტიმიკრობული აგენტი
- ალანტოინი- კანის დაცვა
- Peg-7 გლიცერილ კოკოატი- კანის დაცვა
- დეონიზირებული წყალი - გამხსნელი
- სუნამო

1.3. ანტიმიკრობული ეფექტურობა

მოქმედებს:

- ბაქტერიებზე (მათ შორის ტუბერკულოზის გამომწვევზე)
- სოკოებზე
- ვირუსებზე (მათ შორის ენტეროვირუსებზე)
- დროის ინტერვალი: 15-180 წამი (გამოყენების მეთოდის მიხედვით)

მიკროორგანიზმების ტიპი	ექსპოზიცია (წმ)
ბაქტერიები	15
სოკოები	30
ვირუსები	30-60
ტუბერკულოზის გამომწვევი	60

2. გამოყენების სფეროები

2.1. სამედიცინო დაწესებულებები

- ხელების ჰიგიენისთვის (სამედიცინო პერსონალის ხელების ჰიგიენური და ქირურგიული დეზინფექცია)
- კანის მოსამზადებლად ქირურგიული თუ ინვაზიური პროცედურების წინ (ინტრავენური ან ცენტრალური კათეტერის ჩადგმა)
- ჭრილობების გასუფთავება და გადახვევა
- საინექციო ველის დამუშავება
- სხვადასხვა ჰიგიენური დანიშნულების მქონე ზედაპირების დეზინფექციისთვის.
- ლაბორატორიებში

2.2. საზოგადოებრივი დაწესებულებები

- კვების ობიექტების პერსონალი
- სილამაზის სალონების სპეციალისტები
- საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები
- ფარმაცევტები

3. გამოყენების წესები

3.1. ხელების ჰიგიენური დეზინფექცია

- დოზა: 3მლ
- დრო: 15-30 წამი

მეთოდი: ანტისეპტიკური საშუალების თანაბარი გადანაწილება ხელის ყველა ზედაპირზე . კარგად შეხელების შემდეგ დაყოვნება 15 წამით (გაშრობამდე).

შემდგომ ხელების გაწმენდა არ არის რეკომენდებული.

ხელების ხილული დაბინძურებისას საჭიროა წინასწარ მათი წყლით და საპნით დაბანა.

პროცედურა	საშუალების რაოდენობა (მლ)	ექსპოზიცია (წმ)
ხელების ჰიგიენური დეზინფექცია	3	15-30
ხელების ქირურგიული დეზინფექცია	5-10	120-180
კანის საინექციო არეალის დეზინფექცია სრული დასველება		15-20

3.2. ქირურგიული დეზინფექცია

- დოზა: 5-10მლ
- ქირურგიული დეზინფექციის ხანგრძლივობა 2-3 წუთია და მოიცავს წინამხარის დამუშავებასაც.

3.3. კანის დამუშავება

- კანის სათანადო დეზინფექციისთვის, ხსნარი თანაბრად მოასხურეთ დასამუშავებელ უბანს და ფრთხილი, ერთმიმართულებიანი მოძრაობით გაწმინდეთ საფენით ან დოლბანდით.
- ღია ჭრილობების გარშემო სუფთა არეზე ანტისეპტიკური საშუალების გამოყენებისას, სახვევების შეცვლისას დაიცადეთ ანტისეპტიკური საშუალების გამრობამდე.
- გამოიყენეთ ასეპტიკური ან სტერილური ტექნიკა კანზე ანტისეპტიკური საშუალების წასმის შემდეგ. არ შეეხოთ მომზადებულ არეს არასტერილური ხელთათმანებით ან შიშველი ხელებით.

4. უსაფრთხოების ზომები

4.1. გაფრთხილებები

- აალებადია - მოარიდეთ ღია ცეცხლს
- მოარიდეთ თვალში მოხვედრას
- არ გამოიყენოთ დაზიანებულ კანზე
- შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას

4.2. პირველადი დახმარება

- თვალში მოხვედრისას: გამოიბანეთ წყლის ნაკადით

- გადაყლაპვისას: დალიეთ დიდი რაოდენობით წყალი, მიმართეთ ექიმს
- ალერგიული რეაქციისას: შეწყვიტეთ გამოყენება

5. შენახვა და ვარგისიანობა

5.1. შენახვის პირობები

- ტემპერატურა: 0°C-დან +30°C-მდე
- მზის სხივებისგან დაცულ ადგილას კარგად ვენტილირებულ სივრცეში

5.2. შეფუთვა და ვადები

- შეფუთვის ზომები: 100მლ, 390მლ, 1ლ , 5 ლ
- ვარგისიანობის ვადა: 2 წელი
- გახსნის შემდეგ გამოიყენეთ 6 თვის განმავლობაში

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მწარმოებელი: შპს „ზომა ჯორჯია“

მისამართი: ქ. თბილისი, ფონიჭალა, რუსთავის გზატკეცილი #68ა

ტელეფონი: +995 (591) 541887

ვებ-გვერდი: www.zoma.ge

ელ-ფოსტა: info@zoma.ge